

Inhaltsverzeichnis

- 1 Titelbild: Rathaus Marienplatz München
 Foto: thinkstock

- 4 Risikofaktor Cholesterin für eine bessere Prognose drosseln
 So erreichen Sie das LDL-Ziel ohne Statin-Nebeneffekte

- 6 Nach Infarkt, Angioplastie und Stenting gleich wieder zur Arbeit
 Brauchen PTCA-Patienten noch eine Rehabilitation?

- 6 Neuer Prognosemarker für kardiologische Patienten
 Protein-Antagonist Gremlin-1 zeigt Herzschnitten

- 8 Weniger intrakranielle Blutungen, einfache Therapie
 Nutzen Sie die Vorteile neuer Antikoagulanzen

- 10 50 Jahre falsche Therapie beim kardialen Schock?
 Intraaortale Ballonpumpe bringt nichts

- 12 Weniger Kochsalz, gute Fette, Schluss mit Fertigfutter
 Richtig essen gegen den Bluthochdruck

- 13 Über Jahre hinweg den Körper ruiniert und Hochdruck gezüchtet
 Fixe Dreifachkombi für den «Extrempatienten»

- 14 Neue Zielgruppe für die Infarktprävention entdeckt
 Haben Sie ein Argusauge auf Frauen unter 60!

- 22 Patienten mit angeborenen Herzfehlern gezielt beraten
 Sport mit Fallot: gesund oder tödlicher Leichtsinn?

- 16 ORIGIN: Megastudie mit Basalinsulin bei Typ-2-Diabetes
 Klare Infos zu Herzschutz und Krebsrisiko

- 18 Linagliptin bei Typ-2-Diabetes
 DPP-4-Inhibitor mit Vorteilen

- 20 Basalinsulin allein reicht nicht mehr aus
 Mit «Basal-plus» zum Therapieziel

- 20 Diabetespatient unter Metformin leidet unter Polyneuropathie
 Jetzt den Vitamin B12-Spiegel messen

- 14 Dreierkombination senkt den Blutdruck und verkleinert das Herz
 Diabetiker profitieren vom RAAS-Hemmer